11

11
Sur le trépan dans l'epilepsie de cause externe

Mr anjoubault Mtre en chirurgie a avranche a envoyés a l'academie trois observations 11 dont elle ma chargée de luy rendre compte

N°. 211.

1ere observation

Au mois de may vvri une jeune fille agée de douze ans tomba a la renverse de six pieds de haut elle resta sans connoissance l'espace d'un quart d'heure. revenue a elle, elle se plaignit d'une vive douleur au frone et dans la joue gauche, le landemain il se forma au milieu du froné une tumeur de la grosseur d'une oeuf de poulette, la malade fut saignée du bras du pied et on appliqua sur la tumeur les deffensifs convenables qui la firent diminuée vers le 10e jours, alors les paupieres se quimoserent ensuite toute la face, le devant de la poitrine, le 15eme jour les parties commancerent a reprendre leur couleur naturelle, alors la tumeur qui avoit diminuée augmanta, le mal de teste qui n'avoit point cedé depuis la chutte ~~aug~~ devint plus violent et se dissipa comme la premiere fois par gradation; pr abreger le retour, la disparition de la tumeur, de l'echimose sest fait alternativement de quinze en quinze jours pendant un an, au bout duquel tems lechimose ne reparut plus, mais la tumeur subsista longtems observant qu'elle augmentoit et diminuoit de tems en tems, le mal de teste suivoit ses paroxismes, ce qui a duré un an sans que l'echimose dont il a été ci devant parlé ait reparu, ce qui fait deux ans ecoulées depuis la chutte.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 49
n° 83

la tumeur alors réduite au volume d'une Noisette tenoit par sa fermeté de l'induration; le mal de teste devenus aussi moins violent se renouvelloit quand la Malade faisoit de l'Exercisse et quand elle bessoit la teste, pendant ses deux ans elle Eprouva souvent des Nausées, les yeux senflammoient, quelquefois il luy sortoit un peu de sang par l'oreille gauche, l'appetit, les veigles furent souvent derangées.

2 ans apres la chutte

Mr aujourbault qui n'a vu la Malade qu'a cette Epoque[11] ne rapporte ce qui vient d'estre dit que sur le recit qui luy en a été fait. le cas l'embarassa, il en a écris a Mr Louis qui luy a conseillé de lire le Memoire de Mr quesnay sur le trepan dans les cas douteux apres l'avoir medité il ~~[illegible]~~ proposa a la Malade une incision sur la tumeur pr connoistre l'Etat du crasne; la Malade ne voulut point consentir Esperant que ses douleurs sevanouiroient avec le tems ses Esperances furent vaines; au mois de 9bre 1774 trois ans et demy apres sa chutte l'observateur que la tumeur qu'il avoit trouvé dure et grosse comme une Noisette 18 Mois avant, Etoit plus volumineuses, et les douleurs de teste plus vives qu'alors elles se firent pr la 1ere fois vers l'occiput qui Etoit le lieu qui avoit été frappé dans la chutte la Malade Etant tombée a la renverse. les Elancemens, les vertiges, et autres simptomes violents determinerent la Malade a se laisser

11 / 4 ans Environ apres la chutte

faire ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ l'incision qui avoit été projettée Ce fut le 22 janvier 1775[11] que Mr aujourbault la fit, en l'etandant depuis la racine des cheveux jusqu'a la partie inferieure

du coronal

il trouva les parties incisées et l'os [coronal] très sain; mais
en frappant sur l'os avec le bout d'une sonde, il
excita une douleur très vive vers l'occiput.
l'incision n'empescha pas qu'il ne survint
une foule d'accidents qui par leur singularité
embarasser mr aujourbault qui ne voulut prendre
aucun partis sans consulter, il en écrivit a mr
sabattier, sur son avis, et celuy de mr Louis
précédament pris il se determina a trépaner la
malade sur l'occiput a l'endroit indiqué par la
douleur. le 12 fevrier 1775 il fit une incision
cruciale dans toute l'étandue de l'os; les teguments
se trouverent un peu œdemateux, et l'os sain; la
la malade se trouvant bien soulagée par la dispa=
rition de plusieurs des simptomes qu'elle éprouvoit
refusa qu'on appliqua le trépan. ce soulagemt.
ne dura que quinze jours, il luy prit des accès
de catalepsie, d'épilepsie qui reparoissoient cons=
tamment deux fois le jour ce qu'elle soutint encor
15 jours sans se décider pr le trépan. le 18 mars
il prit a la malade un accès d'épilepsie qui
dura 36 heures. elle étoit sans connoissance, mr
aujourbeau craignant pr la vie de la malade. étant
assisté de six personnes de l'art appliqua une couronne
de trépan sur la partie de l'os occipital sous laquelle
il subsistoit une douleur fixe depuis cinq mois
la pièce d'os emportée la dure mere parut très
tendue et comme cartilagineuse, mais par une
cause quelconque elle s'engagea subittement dans
l'ouverture du trépan; l'operateur la ~~contenue~~
réduite, et la contenue; elle s'est exfoliée au bout
de 15 jours; le tout a été consolidé en trois mois
de tems

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

et la Malade a parfaitemt guery de tous les accidents facheux qu'elle Eprouvoit depuis quatre ans Edemy, elle n'a Eprouvée depuis la cure aucunne incommodité, et jouit d'une tres bonne santé.

réflexions. l'os coronal sur lequel il a toujours subsisté une tumeur, et l'occipital qui a été frappé dans la chutte, ayant étés mis a Decouvert, n'ont presentés aucunne alteration, et il ne fut fait par le trepan aucunne Evacuation de sang, de pus, et de serosité; un aujourdhault qui n'en dit rien, n'ut pas manqué d'en parler; les teguments se sont trouvés un peu adematteux. la dure a paru tendre et comme cartilagineuse. elle s'est Exfoliée, et tout a bien été; l'observation ne nous presante que cette Cause de tous les accidents qu'a Essuyée la malade ___

2eme observation

un jeune homme agé D'environs seize ans tomba ~~de la renne~~ d'un arbre, il resta un moment sans connoissance; en se relevant il sentit une douleur assez vive sur la partie gauche Du coronal sans contusion apparente. il negligea de se faire saigner quoyque la douleur fut permanente. un an apres sa chutte il fut attaqué d'acces Epileptiques. la famille Effrayée consulta sa maladie, on administra sans succes tous les secours indiqués. Deux ans apres on Délibera d'appliquer sur le lieu Douloureux le trepan. le malade y consentit, on ne trouva rien de sous le crane, le malade à guery; et a Déclaré a ceux aujourdhault n'estre plus sujet aux acces D'epilepsie.

Ces Deux observations. singulierement la 1ere Meritte d'estre conservées p^r faire authorité avec plusieurs observations ~~dar~~ rapportées dans le 1^er volume des Mémoires de l'academie; Memoire de M^r quesnay sur le trepan dans les cas douteux, tant p^r des douleurs fixes, et permanentes, que pour des accs d'Epilepsie suitte de violents coups a la teste.

2eme observation communiquée a M^r aujourbault avec regret. de n'avoir point eu connoissance des siennes

un Medecin a soigné une dame, qui le jour de ses Nopces tomba de cheval, la teste sur le pavé, elle se releva un peu Etourdie, de tems en tems elle ressentoit des douleurs sur la partie posterieure du ~~coronal~~ parietal gauche; elle devint Enceinte accoucha un an apres tres heureusemt. En quatre années elle ut trois Enfants, a cette Epoque dès qu'elle buvoit quelques liqueurs spiritueuses, elle ressentoit de si vives douleurs a l'endroit frappé qu'elle ne pouvoit retenir ses cris; elle Epuisa sans resource tous les secours de la Medecine. ses facultées intellectuelles se derangeoient, elle tomba dans des accs d'epilepsie qui s'annonçoient par l'engourdissemt des Mains; elle mourut dans un de ces accs. a l'ouverture du cadavre on trouva sous le pariétal, a l'endroit qui avoit Eté frappé, et ou la douleur avoit Eté fixe, la dure Mere tumefiée, et d'une couleur brune de la largeur d'un liar. le medecin qui a rapporté cette observation a M^r aujourbault luy a avoué qu'il n'avoit jamais Eu l'idée du trepan ne soubconnant pas qu'une chutte dont l'Epoque Etoit de quatre ans put Etre la cause de la mort de cette dame. que s'il avoit Eu connoissance de sa 1ere observation, il n'auroit pas manqué de luy

conseiller cette operation qui luy auroit vraisembla
blemt. sauvé la vie
l'academie fera tel usage qu'elle voudra de ce
recit qui ne me paroit point indifferant au sujet
dont il est question —

observation du mesme sur un bec de lievre
guery par le moyen des cantarides, et du
Bandage unissant

Il y a dans le 5eme volume des memoires de l'academie
la suitte des observations de mr Louis sur le bec
de lievre, dans lequel il dit qu'il est persuader
qu'il y en a baucoup qu'on pouroit guerir sans
incision, en usant primitivemt. des cantarides
et qu'il se propose d'user de ce moyen a la 1re
occasion qui luy paroitra favorable; mr Louis
rapporte que Mr Busch chirurgien a strasbourg
s'en est servis avec succes pr remedier a certaines
difformités restées a des becs de lievre dont la
resection des bords avoit été mal faite.
mr anjoubault qui avoit pris lecture de ce passage
du memoire de mr Louis. s'en est servis utillement.
il rencontra par hazard une jeune fille agée de
18 ans qui portoit depuis sa naissance un bec de
lievre simple, a la levre superieure, qui étoit
fendue jusqu'a l'aille gauche du nez; il luy
demanda si elle ne seroit pas bien aise d'estre
delivré de cette difformité; la fille repondit
qu'elle en seroit tres contente, mais qu'elle ni
consentiroit jamais s'il s'agissoit d'operation.

Mr aujourbault luy fit le Detail du moyen qu'il
employeroit, elle y consentit.

pour nous la panser son procedé il dit je me suis
servis d'un morceau de toille imbibé d'onguent
Epispastique dont je fis un ~~[illegible]~~ roulet molet de la
grosseur d'un tuyau de plume que j'appliquai,
et le soutins au moyen d'un bandage unissant,
après avoir pris la précaution de garnir la levre
des deux costés de petites emplastres de Diachilon
gommé. je levai l'appareil au bout de dix huit
heures, l'Epiderme se détacha facilement. je
rappliquai le bandage unissant, au bout de quatre
jours sans le lever, l'agglutination des bords
paroissoit desja solide, je le laissai encor six jours
de plus. je ne pensai nullement la playe. le succes
a répondu parfaitement a mes desirs. le procedé
nouveau demandoit que mr aujourbault nous fit
un Detail plus circonstantié de la maniere de
l'employé, il a imaginé de former un rouleau de
son emplatre Epispastique pour le placer sans
doute dans la division du bec de lievre, et
rapprocher sur luy les bords de la levre divisée,
pr moy je préfererois une, ou deux petites
languettes de linge couvertes d'emplatres de
cantarides, couverte des deux cotés si on en
mest qu'une, ou d'un seul coté si on en mest
deux, avec la précaution de mettre entre la
gencive et la levre une petite compresse ou
languette de toille gommée pr les garantir de
l'action de l'Epispastique.

Mr aujourbault dit qu'il a garni les ~~deux~~ cotés de la
levre de deux petites emplatres de Diachilon
gommé

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

je ne sai ce qu'il entend par ces deux côtés, si c'est en dessus, ~~et~~ en dessous de la levre, ou a chaque côté de la division exterieurement, c'est ce qu'il ne dit ~~point~~, ni pr qu'elle intention. cette emplatre sous la levre seroit désagréable; appliquée exterieurement je n'en concois point l'utilité, dès qu'il ne s'agit dans cette methode que de détruire l'Epiderme. et de rapprocher les parties l'emplatre vesicatoire, et le bandage unissant remplissent cette intention; le reste de l'appareil ne tient qu'a de petites compresses utillement placées sur les joues pendant la cure, et sous la levre pendant les deux ou trois premiers jours seulement; l'observation de ce bec de lievre. le premier a notre connoissance qui ait été guery par ce moyen méritte d'estre conservé. il y a tout lieu de croire qu'il suffira dans touts les bec de lievre simples sans deperdition de substance, sans ecartement des os.

Ce 28 fevrier 1777

Delamalle